



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 11-02-2020
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPJUKL
Sagsnr.: 1911317
Dok. nr.: 1090259

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 18. december 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 369 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Trine Torp (SF).

Spørgsmål nr. 369:

”Hvor mange personer er i behandling med Quetiapin i doser på op til 150 milligram samtidig med andet antipsykotisk præparat?”

Svar:

Sundhedsdatastyrelsen har som bidrag til besvarelse af spørgsmålet udarbejdet en opgørelse på baggrund af data i Lægemiddelstatistikregisteret. Da der ikke er angivet en tidsperiode i spørgsmålet, har styrelsen lagt til grund, at der ønskes data for samme periode som SSU alm. del – spm. 368, dvs. perioden fra 2008-2018.

Opgørelsen omfatter personer, der er i samtidig behandling med lavdosis Quetiapin (≤ 150 mg) og et andet antipsykotika. Om anvendelsen af Quetiapin henvises til mit svar på spørgsmål 368.

I opgørelsen er der ikke taget højde for personers indløsningsmønstre og dagsdoser. En person kan fx have indløst en recept på lavdosis Quetiapin og tage 2 tabletter om dagen og dermed opnå en dagsdosis på 300 mg.

Sundhedsdatastyrelsen definerer ”samtidig behandling” som en periode på 90 dage. Det betyder, at opgørelsen omfatter personer med receptindløsning på lavdosis Quetiapin, der op til 90 dage før eller efter har indløst mindst en recept på et andet antipsykotika. Personen tæller med i det år, hvor personen har indløst recepten på lavdosis Quetiapin. Der er dermed ikke nødvendigvis overlap i behandlingen med de valgte lægemidler.

Opgørelsen dækker ikke personer, der alene har været i behandling på f.eks. sygehuse eller misbrugscentre, og dermed ikke fået lægemidlerne udleveret fra et apotek.

Tabel 1 viser ifølge Sundhedsdatastyrelsen, at antallet af personer i samtidig behandling med lavdosis Quetiapin og mindst et andet antipsykotika har været stigende i perioden 2008-2018. Antallet er ca. 6.700 personer i 2008 og ca. 12.000 personer i 2018. Samlet set har der været ca. 55.700 unikke personer i samtidig behandling i hele perioden.

Tabel 1 Antal personer i samtidig behandling med lavdosis Quetiapin (≤ 150 mg) og mindst et andet antipsykotika, 2008-2018

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
Antal personer	6.704	7.547	8.237	9.171	10.222	10.877	10.790	10.725	11.011	11.692	11.916	55.705

Kilde: Lægemiddelregisteret pr. 21. december 2019, Sundhedsdatastyrelsen.

Note: Lavdosis Quetiapin er afgrænset til ATC-kode N05AH04 med styrke ≤ 150 mg. Antipsykotika er afgrænset til ATC-gruppe N05A undtagen N05AN (Lithium) og N05AH04 (Quetiapin). Total angiver antal unikke personer for hele perioden. Summering på tværs af år svarer ikke til total, da den samme person kan optræde i flere år. Sundhedsdatastyrelsen definerer samtidig behandling inden for en periode på 90 dage. Det betyder, at opgørelsen omfatter personer med receptindløsning på lavdosis Quetiapin, der op til 90 dage før eller efter har indløst mindst en recept på et andet antipsykotika. Personen tæller med i det år, hvor personen har indløst recepten på lavdosis Quetiapin. Bemærk, at der ikke nødvendigvis er overlap i behandlingen med de valgte lægemidler, og at opgørelsen ikke dækker over personer, der kun har været i behandling på fx sygehuse eller misbrugscentre. Bemærk for lavdosis Quetiapin: Der er ikke taget højde for personers indløsningsmønstre, og personer kan derfor også have indløst recepter på over 150 mg Quetiapin. Det vides derudover ikke, hvilken dagsdosis personerne tager.

Jeg kan henholde mig til Sundhedsdatastyrelsens svar.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Camilla Rosengaard Villumsen