



Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Dato: 01-04-2020
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPJNY
Sagsnr.: 2003719
Dok. nr.: 1147779

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 25. marts 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 789 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Martin Geertsen (V)

Spørgsmål nr. 789:

”Ministeren bedes redegøre for den helt konkrete forskel på den nye strategi for testing annonceret den 22. marts 2020 sammenlignet med den hidtidige strategi, herunder forskellen på, at ”Alle med mistanke om moderat til svær COVID-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en COVID-19-vurderingsenhed på sygehus, skal testes”, som fremgår af den nye strategi, sammenlignet med den strategi, som fremgår af ordførernotat af 20. marts 2020, hvor det fremgår, at ”Personer med moderat alvorlige symptomer (problemer med vejrtrækningen, forværring af symptomer eller syg over flere dage) Personer med moderat alvorlige symptomer skal telefonisk kontakte praktiserende læge, lægevagt eller akuttelefon med henblik på vurdering.””

Svar:

Da Danmark overgik fra en inddæmningsstrategi til en afbødningsstrategi d. 11. marts, blev Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. bl.a. test for COVID-19 også justeret. I forbindelse med dette skifte i den overordnede strategi for håndtering af COVID-19 har det ikke været tydeligt, at der skal testes offensivt. Derfor blev det præciseret d. 20. marts, at det klare strategiske mål er, at langt flere skal testes for COVID-19, og at testkapaciteten i Danmark skal forøges.

I de opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen af 25. marts, som erstattede retningslinjen af 18. marts, bliver det bl.a. præciseret hvilke grupper, der skal henvises til vurdering og testning, herunder kriterier for hvornår voksne henvises til vurdering og udredning. Derudover er det tilføjet, at man skal undersøge og teste, hvis der opstår mistanke om smittespredning på plejehjem og andre institutioner. Det er også angivet i den opdaterede retningslinje, hvordan man skal prioritere i en situation med begrænset testkapacitet.

Det kan i øvrigt oplyses, at Sundhedsstyrelsen løbende konsulterer førende eksperter og hele tiden bygger oven på den nuværende retningslinje i takt med, at de får mere viden.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Jeannette Nybo