



## SUNDHEDSMINISTERIET

Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

### Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 04-05-2021  
Enhed: SPOLD  
Sagsbeh.: DEPEHO  
Sagsnr.: 2106628  
Dok. nr.: 1712823

Folketingets Sundhedsudvalg har den 7. april 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1070 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Phil Lorentzen (V).

#### Spørgsmål nr. 1070:

"Silkeborg tilbød som led i "Jo før – jo bedre"-planen, at de praktiserende læger kunne henvises til lavdosis CT-skanning i stedet for røntgen i det såkaldte 3. diagnostiske spor (uspecifikke hverdagssymptomer, hvor mistanken om lungekræft er minimal, og hvor andre diagnoser er langt mere sandsynlige). Silkeborg fandt signifikant flere i de tidlige stadier og signifikant færre i de sene stadier, og resultaterne har potentialet til at redde flere hundrede lungekræftspatienters liv hvert år, hvis samme resultater (stadiefordeling) kan opnås i hele landet. Sundhedsstyrelsen sendte 28/2-20 et svar til hospitalsledelsen i Viborg-Silkeborg med en formulering omkring henvisningskriterierne til Sundhedsstyrelsens officielle lungekræft-pakke, hvor det fremgik, at alle patienter, hvor der var den "mindste mistanke om lungekræft, skal henvises" til Lungekræftpakken med kontrastforstærket højddosis CT-skanning. Det tolkede hospitalsledelsen således, at det også gjaldt i det 3. diagnostiske spor, hvorfor Silkeborg blev pålagt at genindkalde mere end 100 patienter til en kontrastforstærket højddosis CT-skanning, skønt risikoen for at påvise lungekræft blot var 1/1000 svarende til risikoen for, at den kontrastforstærket højddosis CT-skanning udløser en strålingsbetinget cancer. Er ministeren enig i, at Sundhedsstyrelsen brev af 28/2-20 kun omhandlede patienter med "klinisk" (eller begrundet) mistanke om lungekræft og derfor ikke omfattede gruppen med uspecifikke hverdagssymptomer, hvor mistanken om lungekræft er minimal, og hvor andre diagnoser er langt mere sandsynlige (det 3. diagnostiske spor), hvor de praktiserende læger kan henvises til den billeddiagnostiske modalitet, der findes mest hensigtsmæssig for patienten (røntgen, labddosis CT), eller blot vælge at se an om symptomerne svinder spontant. "

#### Svar:

. / . Der henvises til besvarelse af SUU alm. del spm. 93.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Emilie Holkmann Olsen