



SUNDHEDSMINISTERIET

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 11-08-2021
Enhed: MEDINT
Sagsbeh.: DEPKLN
Sagsnr.: 2109920
Dok. nr.: 1827456

Folketingets Sundhedsudvalg har den 26. maj 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 1322 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF).

Spørgsmål nr. 1322:

”Hvad er status på antallet af kvinder, som rammes af bivirkninger som følge af brug af p-piller, og hvilke bivirkninger kan der typisk være tale om?”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet bidrag fra Lægemiddelstyrelsen, til hvilket jeg henholder mig. Lægemiddelstyrelsen oplyser:

”De kendte bivirkninger og bivirkningsfrekvenser for p-piller fremgår af lægemidlernes produktresumé og indlægsseddel. Der findes forskellige typer p-piller, som er indelt i 4 generationer. De ældste typer p-piller er 1. og 2. generation, og de nyeste typer p-piller er 3. og 4. generation. P-piller adskiller sig indbyrdes ved at indeholde forskellige typer hormoner (gestagentyper).

Lægemiddelstyrelsen har anbefalet, at p-piller, der er 2. generation, bør være førstevalg, når der udskrives p-piller, fordi den type p-piller har den laveste risiko for venøse tromboembolier (blodpropper). De fleste kvinder, som benytter p-piller, får udskrevet 2. generations p-piller (91,1 % i 2020). Blodpropper er generelt en sjælden bivirkning ved p-piller.

Lægemiddelstyrelsen har i perioden fra 1. januar 2016 til 1. juni 2021 modtaget 287 indberetninger om formodede bivirkninger ved p-piller. De fleste indberetninger vedrører kendte bivirkninger som fx hovedpine, svimmelhed, kvalme, brystmerter, hævede arme eller ben, smerter i arme eller ben, træthed, blødning mellem menstruationsperioder, vægtøgning og blodpropper. Lægemiddelstyrelsen har i perioden modtaget 93 indberetninger om blodpropper ved p-piller. Forbruget af p-piller har i perioden 2016-2020 været faldende fra 60,1 pr. 1.000 indbyggere i 2016 til 46,9 pr. 1.000 indbyggere i 2020.

Nedenfor følger eksempler på meget almindelige bivirkninger ($\geq 1/10$) eller almindelige bivirkninger ($\geq 1/100$ til $< 1/10$), der er beskrevet i produktinformation for p-piller omfattet af de 4 generationer.

P-piller (første generation):

Hovedpine, migræne eller forværret migræne, kvalme, blødning, brystmerter, brystspænding, rygsmerter, væskeophobning, depression eller forværret depression, muskelknuder (godartede) i livmoderen, svampeinfektion og vægtøgning.

P-piller (anden generation):

Hovedpine, svimmelhed, migræne, kvalme, opkastning, humørsvingninger, depression, søvnproblemer, blødning, mavesmerter, diarré, forstoppelse, oppustethed, bryst smerter, brystspænding, smerter i ekstremiteter (arme og ben), rygsmerter, væskeophobning, asteni (træthed), akne, udslæt, urinvejsinfektion, vaginal infektion, pletblødning og vægtøgning.

P-piller (tredje generation):

Hovedpine, svimmelhed, kvalme, akne, mavesmerter, bryst smerter, brystspænding humørsvingninger, depression, nervøsitet, blødning/pletblødning, svampeinfektion, pletblødning og vægtøgning.

P-piller (fjerde generation):

Hovedpine, migræne, kvalme, nedtrykthed, depression, mavesmerter, asteni (træthed), bryst smerter, svampeinfektion og pletblødning. ”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Kristine Lilholt Nilsson