



Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg

Holbergsgade 6  
DK-1057 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Dato: 23-11-2020  
Enhed: SPOLD  
Sagsbeh.: DEPAJU  
Sagsnr.: 2015446  
Dok. nr.: 1456940

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 26. oktober 2020 stillet følgende spørgsmål nr. 93 (Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kirsten Normann Andersen (SF).

Spørgsmål nr. 93:

” Kan ministeren i forlængelse af bl.a. artiklerne ”Regioner har forskellig holdning til brug af røntgen og lavdosis-CT” i Dagens Medicin den 20. maj 2020, ”Fredberg, jeg melder pas på dit forsøg på at gøre faglig strid politisk” og ” En person fra Silkeborg-sagen har fået konstateret lungekræft”, begge i Sundhedspolitisk tidsskrift den 19. oktober redegøre for:

- Hvornår læger forventes at bruge henholdsvis røntgen, lavdosis- eller højddosis scanning?
- Hvilken form for undersøgelse – røntgen eller scanning - som bedst giver grundlag for at diagnosticere en patient?
- I fald konkrete scanninger giver de bedste muligheder for at diagnosticere en patient, mener ministeren så, at alle patienter skal tilbydes scanning i forbindelse med udredning? ”

Svar:

. / . Til besvarelse af spørgsmålet vedlægger jeg Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. henvisning og visitation til billeddiagnostisk udredning af symptomer fra lunger med særlig fokus ved mistanke om lungekræft. Som bilag til vejledningen er vedlagt rammenotat af 24. juni 2020 vedrørende håndtering af symptomer fra lungerne, der kan være kræft.

Sundhedsstyrelsen har den 20. november 2020 udsendt vejledningen til en bred kreds af interessenter, herunder til regionerne, Dansk Delskab for Almen Medicin og andre relevante selskaber, Kræftens Bekæmpelse m.fl.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Annemette Juul