



SUNDHEDSMINISTERIET

Epidemiudvalget 2021-22
EPI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 73
Offentligt

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Epidemiudvalg

Dato: 01-02-2022
Enhed: BESS
Sagsbeh.: DEPPHHA
Sagsnr.: 2119589
Dok. nr.: 2047659

Folketingets Epidemiudvalg har den 13. december 2021 stillet følgende spørgsmål nr. 73 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Liselott Blixt (DF).

Spørgsmål nr. 73:

”Vil ministeren oplyse, om det er sikkert at holde jul med udsatte og ældre, hvis man alene har fået et negativt kviktest-svar, idet kviktests jo kan misse ca. 47 pct. af smittetilfældene?”

Svar:

Jeg har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet bidrag fra Statens Serum Institut, som jeg henholder mig til:

”Følsomheden af antigenest er lavere end ved PCR-test. Der er derfor større risiko for falsk negative svar ved antigenest end ved PCR test. Det vil sige, at nogle smittede personer vil få et negativt svar ved antigenest, men hvis man tester dem med PCR-test, vil svaret være positivt. Det forhold at følsomheden af antigenest er lavere end for PCR-test, betyder ikke at brug af antigenest ikke, kan være brugbare/effektive. Antigenest kan være et vigtigt screeningsredskab og et godt værktøj til at reducere smitte og kan bruges som en smitteforebyggende indsats for at understøtte epidemikontrollen. En fordel, i forhold til PCR-test, er at antigenesten giver et hurtigt svar, og kan tages lige inden den situation, hvor man vil forebygge introduktion af smitte, således kan de individer, der har mest virus og dermed i reglen også er mest smitsomme på det tidspunkt, testen bliver taget, fanges. Herudover skal antigenest ses som et supplement til Sundhedsstyrelsen generelle råd om smitteforebyggelse herunder vaccine, god håndhygiejne, afstand, udluftning, rengøring og ikke mindst at blive hjemme og blive testet med en PCR-test ved symptomer. I forlængelse heraf skal det bemærkes, at antigenest som ved andre test kun giver et øjebliksbillede. I tilfælde af et negativt testsvar fra en antigenest, men efterfølgende udvikling af symptomer på covid-19, bør der derfor følges op med en PCR.”

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke / Philip Hadberg