



SUNDHEDSMINISTERIET

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 19-08-2022
Enhed: SPOLD
Sagsbeh.: DEPEHO
Sagsnr.: 2210378
Dok. nr.: 2374070

Folketingets Sundhedsudvalg har den 12. august 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 987 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kristian Phil Lorentzen (V).

Spørgsmål nr. 987:

” For 8 år siden lavede den tidligere regering en ”Jo-før-jo-bedre”-plan, der skulle give de praktiserende læger mulighed for at henvise direkte til CT-skanninger uden om kræftpak-kerne for at stille hurtigere kræftdiagnoser. For 7 år siden tillod Regionshospitalet Silkeborg de praktiserende læger at henvise til lavdosis-CT-skanning i stedet for den usikre røntgen af lungerne, hvis mistanken om lungekræft var så lille, at der ikke var indikation for at henvise til den omfattende Lunge-kræftpakke (det såkaldte 3. diagnostiske spor). På baggrund af resultaterne i Silkeborg beregnede eksperter, at lavdosis CT i det 3. spor kan redde livet på flere hundrede lungekræftpatienter årligt. Stadietfordelingen ved nydiagnosticeret lungekræft ved lavdosis CT i det 3. diagnostiske spor svarer stort set til stadietfordelingen i verdens største screeningsstudie (NELSON-studiet). En oversigtsartikel fra 2022 i et internationale peer review tidsskrift dokumenterer og anbefaler lavdosis CT i det 3. diagnostiske spor. I det 3. diagnostiske spor findes ca. 2,5 pct. at have lungekræft. Forskellen på lav- og højdosis CT i et ”lavincidensområde” som det 3. diagnostiske spor er så beskeden, at de ekstra kræftfund på højdosis CT opvejes af ekstra strålingsinducerede kræfttilfælde. Højdosis CT tager 3 gange så lang tid at lave og dobbelt så lang tid at beskrive i forhold til lavdosis CT. Region Midt stoppede i 2020 efter 5 år med landets bedste resultater for nydiagnostik af lungekræft tilbuddet, som de fandt var en ”brist i patientsikkerheden”, trods massive protester fra fagfolk. Påstanden om ”brist i patientsikkerheden” blev senere afkræftet, og den 1/7-22 har regionerne nu i fællesskab vedtaget, at alle praktiserende læger må henvise til CT-skanninger i stedet for røntgen af lungerne i det 3. diagnostiske spor. I betragtning af den uheldige håndtering af forløbet, hvad vil sundhedsministeren da gøre for at sikre, at ordningen bliver implementeret hurtigst muligt i hele landet, så der ikke unødigt tabes flere menneskeliv? ”

Svar:

Da der til brug for besvarelse af spørgsmålet skal indhentes bidrag fra Sundhedsstyrelsen, er det desværre ikke muligt for mig at besvare spørgsmålet inden for fristen. Jeg forventer at kunne besvare spørgsmålet endeligt primo oktober 2022.

Med venlig hilsen

