



# INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Sundhedsudvalget 2022-23 (2. samling)  
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 363  
Offentligt

Slotsholmsgade 10-12  
DK-1216 København K

T +45 7226 9000  
F +45 7226 9001  
M sum@sum.dk  
W sum.dk

Folketingets Sundhedsudvalg

Dato: 27-06-2023  
Enhed: FOST  
Sagsbeh.: DEPMNEN  
Sagsnr.: 2305971  
Dok. nr.: 2713759

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 363 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 26. april 2023. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik Thulesen Dahl (DD).

Spørgsmål nr. 363:

"I "Teknisk notat om risiko ved alkoholforbrug" fra 7. marts 2022 fremgår det på side 3 i tabel 1, "Eksempler på risiko ved forskellige drikkemønstre": "En voksen person drikker i gennemsnit 10 genstande om ugen fordelt på syv dage. Risikoen for, at personen dør tidligere end forventet på grund af en alkoholrelateret tilstand, vil være omkring 0,1%." Vil ministeren på den baggrund redegøre for beregningens grundlag, herunder oplyse, om risikoen for, at den omtalte voksne person dør af en ulykke eller en ikke-alkoholrelateret tilstand – eksempelvis at den omtalte voksne person dør af en tobaksrelateret tilstand eller af et hjertestop – er inkluderet i beregningen, eller om beregningen er isoleret til alene at vedrøre påvirkning fra alkohol?"

Svar:

Til besvarelse af spørgsmålet har jeg indhentet bidrag fra Sundhedsstyrelsen, der oplyser følgende, som jeg vil henholde mig til:

"Sundhedsstyrelsen har ved revidering af udmeldingerne om alkohol anvendt risikoestimer fra den australske rapport Australian Guidelines to Reduce Health Risks from Drinking Alcohol (2020), hvilket er beskrevet i Sundhedsstyrelsens "Teknisk notat om risiko ved alkoholforbrug". Det er blandt andet på baggrund af, at drikkemønsteret i Australien ligner det danske.

Den australske rapport bygger på 38 reviews og metastudier samt en matematisk modellering, som estimerer risikoen for alkoholrelateret sygdom og død af alle årsager ved forskellige drikkemønstre og mængder. Det, der specifikt er set på i de australske risikoestimer, er risikoen for død pga. en alkoholrelateret tilstand eller skade.

Der er taget højde for andre risici for død herunder tobaksrelaterede tilstande. Der henvises til det australske baggrundsnotat<sup>1</sup>: *Mortality and morbidity risks from alcohol consumption in Australia, The University of Sheffield, 7th August 2019.*"

Med venlig hilsen

Sophie Løhde

<sup>1</sup> [10-mortality-morbidity-risks-from-alcohol-cons.pdf \(nhmrc.gov.au\)](https://www.nhmrc.gov.au/publications/110-mortality-morbidity-risks-from-alcohol-cons.pdf)