



INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Sundhedsudvalget 2024-25
SUU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 317
Offentligt

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K

T +45 7226 9000
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 27-03-2025
Enhed: Patientsikkerhed og Lovkvalitet
Sagsbeh: ilj
Sagsnr.:2025 - 2597
Dok. nr.: 313990

Folketingets Sundhedsudvalg

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 317 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 28. februar. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peder Hvelplund (EL).

Spørgsmål nr. 317:

”Vil ministeren med bidrag fra Sundhedsstyrelsen redegøre for i forbindelse med hvilke tandbehandlinger, der typisk udføres operative indgreb i direkte relation til tungenerven (n. lingualis) og underkæbenerven (n. alveolaris inferior)?”

Svar:

Til brug for besvarelsen har ministeriet indhentet bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som er den relevante myndighed til at vurdere den faglige standard i forbindelse med udførelsen af de omtalte tandbehandlinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser følgende, som jeg kan henholde mig til:

Tandbehandlinger, der udføres i direkte relation til underkæbenerven (n. alveolaris inferior) omhandler kirurgiske indgreb, der involverer områderne som relaterer sig til rodspidserne (apikale områder) ved de store og små kindtænder (molar- og præmolarregionen).

Det er eksempelvis fjernelse af visdomstænder, implantatbehandlinger og rodbehandlinger udført fra rodspidsen (retrograd). I yderst sjældne tilfælde kan en gren af underkæbenerven (n. alveolaris inferior (n. mentalis)) blive beskadiget under kirurgiske indgreb ved fortænder og hjørnetænder i underkæben.

Tandbehandlinger, der udføres i direkte relation til tungenerven (n. lingualis) omhandler kirurgiske indgreb, der involverer den orale slimhinde i underkæben ved de store og små kindtænder (i molar- og præmolar regionen). Det er eksempelvis fjernelse af visdomstænder og kirurgi i forbindelse med parodontose.

Derudover kan anlæggelse af lokalbedøvelse (lokalanægesi) oralt i underkæben ved de store og små kindtænder (i molar- og præmolar regionen) udføres i direkte relation til nerven.

Med venlig hilsen

Sophie Løhde